

หยุดใช้เลือดออก
หยุดภัยใกล้ตัว



ด้วยความปลอดภัย



อันตรายถึงชีวิต !

ไข้เลือดออก



รู้ทันโรค

ไข้เลือดออก



กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลท่าวัง

การระบาดของไข้เลือดออก

ช่วงเวลาระบาดของโรคไข้เลือดออก
สามารถพบได้ตลอดทั้งปี แต่จะระบาดมากใน
ฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของ
ทุกปี



ป้องกันไว้ดีกว่าแก้

คนที่บ่น
เหงื่อออกมาก

คนที่ตัวร้อน
(อุณหภูมิบริเวณ
ผิวหนังสูง)

คนที่หายใจแรง
เพราะคาร์บอน-
ไดออกไซด์
เป็นตัวดึงดูดยุง

ผู้หญิง
มากกว่าผู้ชาย
เพราะฮอร์โมน
แตกต่างกัน

เด็ก มากกว่าผู้ใหญ่
เพราะกลิ่นและลักษณะ
ผิวหนัง

คนที่ใส่เสื้อผ้าสีเข้ม

**ยุง ชอบกัด
คนประเภทไหน**

อย่างไรก็ตาม ทุกคนมีโอกาสโดนยุงกัดได้หมด อย่างละอ่าใจ ควรระวังและป้องกันตัวไม่ให้ถูกยุงกัด จะดีที่สุดนะจ๊ะ

► การป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด

- จัดบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
- เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ไม่ใช้บ่อยๆ เช่น แจกัน ทุก 7 วัน
- นอนในมุ้ง ปิดมุ้งลวด
- ใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง หรือสารไล่แมลง
- ทายากันยุง ใช้ยาจุดกันยุง เครื่องไล่ยุงไฟฟ้า

โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ



การป้องกันโรค ใช้สี๑๑๑๑๑

หยุด!!

ไข้เลือดออก



ไข้เลือดออก (Dengue Fever)

เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส
เดงกี (Dengue) ที่แพร่สู่ร่างกาย
คนจากการกัดของยุงลายตัวเมีย
ผู้ป่วยจะมีไข้สูง มีอาการป่วย
รุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดา

อาการของไข้เลือดออก

อาการเบื้องต้นคล้ายไข้หวัดทั่วไป เช่น
มีไข้สูง ตัวร้อน ปวดหัว
ปวดเมื่อย อ่อนเพลีย แต่ผู้ป่วยไข้เลือดออก
จะมีอาการแสดงที่รุนแรงกว่า คือ มีไข้สูง
มาก ปวดหัวมาก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
ทั่วลำตัว ในบางรายอาจคลื่นไส้ อาเจียน
อาจพบผื่นแดงหรือจ้ำเลือดใต้ผิวหนังทั่วตัว
หรือมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมา เช่น
มีเลือดออกตามเนื้อเยื่อในร่างกายในราย
ที่ร่างกายอ่อนแอและมีภูมิคุ้มกันต่ำ

ตัวอย่างวิธีการควบคุมสิ่งแวดล้อม

เป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเพื่อ

ไม่ให้ยุงมีการขยายพันธุ์ เช่น

- แท็งก์น้ำ บ่อ กะละมัง ต้องมีฝา
ปิดและหมั่นตรวจสอบว่ามีลูกน้ำ
หรือไม่
- ตรวจสอบแจกัน ถ้วยรองขาโต๊ะ
ต้องเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์
- ตรวจสอบรอบๆ บ้านว่ามีแหล่ง
น้ำขังหรือไม่ หากมีต้องจัดการ
- หากใครมีรั้วไม้ หรือต้นไม้ที่มีรู
กลวง ให้นำคอนกรีตเทใส่ปิดรู
- ขวดน้ำ กระป๋อง หรือภาชนะอื่นที่
อาจจะเก็บขังน้ำ หากไม่ใช้ให้ใส่ถุง
หรือฝังดินเพื่อไม่ให้มีน้ำขัง