



WHO เตือน! กลุ่ม 608

ผู้สูงอายุ , ผู้มีโรคประจำตัว
ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ , กลุ่มเปราะบาง
ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน

ควร

ได้รับวัคซีน 1 โดส
และเข็มกระตุ้นหรือบูสเตอร์
12 เดือนขึ้นไป หลังจาก
ที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มล่าสุด

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2567

ที่มา : กองโรคติดต่อทั่วไป


สำนักสื่อสารความเสี่ยง
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Bureau of Risk Communication
and Health Behavior Development

 สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422



มาป้องกัน Covid-19 ในกลุ่มเสี่ยงกันเถอะ

มีอาการคล้ายหวัด
ผลตรวจ ATK เป็นบวก
ให้สวมหน้ากากอนามัย

เสี่ยงที่แออัด
หากต้องออกจากบ้าน
ให้สวมหน้ากากอนามัย

สังเกตอาการ
รีบไปพบแพทย์
เมื่อมีอาการ
หอบเหนื่อย
หายใจลำบาก

เสี่ยงใกล้ชิด
ผู้ป่วยโรคโควิด 19
หรือผู้ป่วยโรคหวัด
โรคไข้หวัดใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2567

ที่มา : กองโรคติดต่อทั่วไป

สำนักสื่อสารความเสี่ยง
และพัฒนากฎการสุขภาพ
Bureau of Risk Communication
and Health Behavior Development

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

