

หากถูกกัดแล้ว
ควรปฏิบัติตนอย่างไร ?

1

ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด
ฟอกสบู่เบาๆ ให้ถึงก้นแผลและ
ล้างออกให้หมด (ทำซ้ำเป็นเวลานาน 15 นาที)
การล้างแผลจะช่วยลดปริมาณเชื้อได้ถึง 80%



2

ทายาเบตาดีนและรับมาพบแพทย์
โดยเร็วที่สุด เพื่อรับการรักษาและ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค




3

กักสุนัขเพื่อดูอาการ 10 วัน
ถ้าตายให้นำซากมาตรวจ
แต่ถ้าไม่ตายแสดงว่าสุนัขตัวนั้น
ไม่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า



สุนัขกัดต้องล้างแผลใส่ยา
กักหมา หามอฉีดวัคซีนต่อ
จนครบชุด



ป้องกันสุนัขกัด...
ได้อย่างไร ?



หลักกา 5 ย. ได้แก่

"อย่าแหย่ อย่าเหยียบบ อย่าแยก
อย่าขยิบ อย่ายุ่ง"


1

อย่าแหย่
ในสุนัขโมโน



2

อย่าเหยียบบสุนัข
หรือทำใหตกใจ



3

อย่าแยก
สุนัขที่กำลังกัดกัน
ด้วยมือเปล่า



4

อย่าขยิบ
ขามอาหาร
หรือบองที่สุนัขหวง

5


อย่ายุ่ง
กับสุนัขจรจัดหรือสุนัข
ที่ไม่ทราบประวัติวัคซีน



โรค
พิษสุนัขบ้า



"โรคนี้ไม่มีทางรักษาให้หายได้"
หากมีอาการแล้ว...ตายทุกราย




โรคพิษสุนัขบ้า



โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง
เกิดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด
เช่น สุนัข แมว โค กระบือ สุกร รวมถึงคน
เมื่อได้รับเชื้อหากปล่อยไว้จนเกิดอาการ
จะเสียชีวิตทุกราย แต่โรคนี้สามารถ
ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน



สัตว์ที่เป็น โรคพิษสุนัขบ้า มีอาการอย่างไร ?



สัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า อาจแสดง
อาการได้ 3 ระยะ ได้แก่



ระยะเริ่มแรก



มีอาการแฉะนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม
กินข้าว กินน้ำลดลง



ระยะตื่นเต้น

กระวนกระวาย ตื่นเต้นไม่อยู่นิ่ง
กัดทุกอย่างไม่เลือก รังไล่กัดคนหรือสัตว์



ระยะอัมพาต



ค้างตาก ฉี่ห้อยสีแดงคล้ำ น้ำลายไหล
ทรงตัวไม่ได้ เป็นอัมพาตและตาย
ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะติดจากสัตว์
ที่มีอาการเหล่านี้



ติดเชื่อได้ทางไหนบ้าง ?

สามารถติดเชื่อโรคพิษสุนัขบ้าได้ 2 ทาง คือ



ถูกกัดหรือข่วน ทำให้น้ำลายของสัตว์
เข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผล แผล
เล็กน้อยก็สามารถติดเชื่อได้



ถูกเลียที่บาดแผล รอยถลอกหรือ
รอยขีดข่วนรวมทั้งริมฝีปากหรือหย่านตา



อาการโรคพิษสุนัขบ้า เป็นอย่างไร ?

(ผู้ป่วยจะแสดงอาการ หลังได้รับเชื้อประมาณ
3 สัปดาห์ - 6 เดือน หรืออาจนานถึง 1 ปี)



อาการเริ่มแรก

ไข้ต่ำ เจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย และ
คันรุนแรงบริเวณแผลที่ถูกกัด



อาการทางประสาท

กระสับกระส่าย คลุ้มคลั่ง กระวนกระวาย
กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง มีอาการ
หนาวสั่น กลืนลำบากโดยเฉพาะของเหลว



อาการระยะสุดท้าย

กล้ามเนื้อเกร็ง - กระตุก แขนขาอ่อนแรง
หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก หอบหืดและเสียชีวิต
ในที่สุด